Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº
SP 000009-4.000004

Téc. Resp.: Roberta Costa e Sousa Rezende
CRF-SP 88.540

FABRICANTE: IPANEMA INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.
Rod. Raposo Tavares, Km 113 - Barreiro
CEP: 18190-000
Araçoiaba da Serra - São Paulo - SP
CNPJ/MF nº: 64.687.015/0001-52
Indústria Brasileira

PROPRIETÁRIO: EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.
Rod. Pres. Castello Branco, km 35,6
Itapevi - SP
CPNJ: 61.190.096/0008-69
Indústria Brasileira

CENTRAL DE ATENDIMENTO
0800-709-1999

CUIDADO VENENO

Partida:
Fabricação: Reserva de Verniz
Vencimento:

416211
240513-00 (09/19)

7 891317 162115

PEARSON
SAÚDE ANIMAL

Ciclorfós®

USO VETERINÁRIO

ECTOPARASITICIDA PARA BOVINOS

"ATENÇÃO: PERÍODO DE CARÊNCIA"
ABATE: 17 DIAS
LEITE: 3,5 DIAS (7 ORDENHAS)

Conteúdo: 1 L

Eurofarma

FÓRMULA: Cada 100 mL contém:
Cipermetrina ..... 20,00 g
Clorpirifós ..... 50,00 g
Veículos q.s.p. ..... 100,00 mL

INDICAÇÕES
É um parasiticida de uso externo destinado ao tratamento de carrapatos (Rhipicephalus (Boophilus) microplus), bernes (Dermatobia hominis) e até 28 dias de controle de moscas (Haematobia irritans) em bovinos.

MODO DE USAR E POSOLOGIA
O produto é indicado em banhos de aspersão ou pulverização com pulverizadores ou bombas mecânicas ou manuais.
Diluir 1 litro do produto para 1000 litros de água, ou seja, 10 mL do produto para cada 10 litros de água.

Recomenda-se aplicar o produto até que todo o corpo do animal esteja molhado. Sugere-se que a aplicação seja realizada individualmente com o animal contido.

"ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA"
BOVINOS: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 17 DIAS APÓS A APLICAÇÃO.
LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER UTILIZADO PARA CONSUMO HUMANO 3,5 DIAS (7 ORDENHAS) APÓS O TRATAMENTO.
A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

CONTRAINDICAÇÕES E PRECAUÇÕES
Não utilizar em fêmeas prenhes.
Não administrar em animais que apresentem lesões cutâneas extensas.
Chuvas torrenciais podem remover o produto da superfície do corpo dos animais tratados, diminuindo o período de proteção proporcionado pelo produto no controle das endectoparasitoses.

OUTROS CUIDADOS
- Evitar o contato com a pele e com os olhos. Se ocorrer contato acidental, lavar o local afetado com água abundante.
- Lavar as mãos com água e sabão sempre que houver contato com o produto;
- Não guardar ou aplicar o produto próximo de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene e domésticos;
- Destruir as embalagens vazias;
- No caso eventual de acidentes com pessoas procure imediatamente o Médico;
- Não dar de beber ao acidentado substâncias gordurosas ou leite.

ANTÍDOTO
Sulfato de atropina associado com reativadores da colinesterase (PAM, Contrathion e Toxogonin).

Conservar o produto em local seco e fresco, em temperatura entre 15° e 30°C, ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos. Após a abertura do frasco, utilizar todo o conteúdo em até 6 meses.