

BISMUCAR®

Subsalicilato de Bismuto 87.33 mg/ 5 mL

SABOR A FRESA

Acidez

Indigestión

Malestar Estomacal

Suspensión Oral

FÓRMULA

Cada 5mL contiene:

Subsalicilato de Bismuto 87,33 mg

Excipientes c.s.p.

Cada 15mL contiene:

Subsalicilato de Bismuto 262 mg

Excipientes c.s.p.

VENTA SIN RECETA MÉDICA

Agitar antes de usar

GRUPO TERAPÉUTICO:

ALIVIO DEL MALESTAR ESTOMACAL Y ANTIDIARREICO

INDICACIONES Y USOS

Bismucar® está indicado para:

- Malestar estomacal
- Alivia: acidez, indigestión, malestar estomacal, náuseas y diarrea.

DOSIS

Para una dosificación exacta utilizar el vaso dosificador.

Adultos y niños mayores de 12 años: 30mL (2 cucharadas de 15 mL ó 6 cucharaditas de 5 mL) cada 1/2 o 1 hora según sea necesario. No exceder de 8 dosis (16 cucharadas o 240mL) en 24 horas.

Usar hasta interrumpir la diarrea, pero no por más de 2 días. Menores de 12 años consultar con el médico. Beber abundante líquido para ayudar a prevenir la deshidratación causada por la diarrea.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con alergia a los salicilatos (incluida aspirina), que estén tomando otros productos con salicilato.

Otra información, cada 15mL contiene:

- Sodio: 0,84mg
- Salicilato: 98,25mg

Venta sin receta médica. Agitar antes de usar

ADVERTENCIAS Y PRECUACIONES

No usar en caso de Síndrome de Reye. Los niños y adolescentes que tienen o se están recuperando de varicela o de síntomas de gripe no deben usar este producto. Si al utilizar Bismucar se producen cambios en el comportamiento acompañado de náuseas y vómitos, consulte con un médico, debido a que estos síntomas pueden ser señal temprana del Síndrome de Reye.

No lo use si tiene:

- Úlcera • Pérdida de sangre • Deposiciones negras o con sangre

Consulte con un médico antes de usar si tiene:

- Fiebre • Moco en las deposiciones

Preguntar al médico o farmacéutico antes de usar, si está tomando otros medicamentos para:

- Anticoagulación (diluyentes de la sangre)
- Diabetes • Gota • Artritis

Durante el uso del producto se puede presentar un oscurecimiento temporal e inofensivo de las deposiciones y/o la lengua.

Suspenda su uso y pregunte al médico si:

Los síntomas empeoran, presenta zumbido en los oídos o pérdida de la audición y la diarrea persiste por más de 2 días

Consulte con un profesional de la salud antes de ser usado en caso de embarazo y lactancia.

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de sobredosis solicite asistencia médica o acuda al centro de salud más cercano.

Almacenar a no más de 30°. Proteger de la congelación.

Elaborado por:

EUROFARMA PERÚ S.A.C

Av. Bolivia 1161 - Lima 05-Perú

Central telefónica: 610-3100

R.S.: EN-00743

R.U.C.:20100284937

Producto Peruano

Directora Técnica:

Q.F.: Janet Ulloa S