


216127



dimensiones: 13 cm x 16 cm



Vertin®

Lomifilina + Dihidroergocristina

Antivertiginoso

Composición

Cada comprimido recubierto gastroresistente de **Vertin®** contiene:
Lomifilina 80 mg; Dihidroergocristina mesilato 0,8 mg;
excipientes c.s.

Propiedades

Farmacodinámicas

Vertin® (lomifilina-dihidroergocristina) es una combinación a dosis fija de lomifilina y mesilato de dihidroergocristina.

La lomifilina es un derivado metilxantínico relacionado con la pentoxifilina. La principal propiedad farmacológica de la lomifilina es que produce aumento del flujo sanguíneo en la microcirculación debido a sus propiedades hemorreológicas sobre los glóbulos rojos, lo que disminuye la viscosidad sanguínea, esto produce mejoría en la llegada de oxígeno y nutrientes a los tejidos en particular al cerebro y el aparato cócleo - vestibular, áreas cuya irrigación puede encontrarse disminuida como consecuencia de arteriosclerosis en los vasos de pequeño calibre.

El mesilato de dihidroergocristina es un derivado de los alcaloides del cornezuelo de centeno, con propiedades agonistas dopaminérgicas y serotoninérgicas, así como antagonistas alfa adrenérgicas, que produce vasodilatación y mejora el metabolismo neuronal.

Vertin® (lomifilina-dihidroergocristina) debido a la acción conjunta de sus componentes, reactiva el metabolismo cerebral, mejorando los síntomas atribuibles al envejecimiento cócleo-vestibular (vértigos, mareos, inestabilidad en la marcha y

acúfenos) y cerebral (pérdida de memoria reciente, desorientación témporo - espacial, inestabilidad emocional, desinterés, etc.)

Farmacocinéticas

Ambas drogas se absorben en forma rápida y completa luego de su administración oral. Presentan elevado metabolismo de primer paso hepático por lo cual su vida media de eliminación se prolonga en caso de insuficiencia hepática.

La lomifilina aumenta la absorción y biodisponibilidad de la dihidroergocristina cuando se administran en forma conjunta.

Indicaciones

Vertin® (lomifilina-dihidroergocristina) está indicado en el tratamiento de los síntomas producidos por alteración del aparato cócleo-vestibular, tales como vértigos y mareos. Se halla indicado en el tratamiento sintomático del vértigo de origen vascular, vértigo posicional agudo, neuritis vestibular, síndrome de Ménière, vértigo post traumático y laberintitis aguda. En todos los casos y particularmente en el síndrome de Ménière, deberá determinarse la etiología del trastorno previo al inicio del tratamiento.

Como consecuencia de la acción antivertiginosa de **Vertin®** (lomifilina-dihidroergocristina) se produce mejoría de las manifestaciones óculo motoras, posturales y vegetativas del trastorno, a saber, nistagmo, ataxia y náuseas.

Vertin® (lomifilina-dihidroergocristina) está indicado asimismo en el tratamiento de los trastornos psico - comportamentales asociados con el envejecimiento cerebral, percibiéndose luego de algunas semanas de tratamiento mejoría de síntomas tales como: confusión, desorientación, mareos, astenia, desmotivación, etc. **Vertin®** (lomifilina-dihidroergocristina) puede emplearse también en el tratamiento de síntomas subjetivos producidos luego de traumatismos cráneo encefálicos.

Dosis y Administración

La dosis recomendada de **Vertin®** (lomifilina-dihidroergocristina) es de 2 a 3 comprimidos diarios (1 comprimido cada 8 o 12 horas), salvo otra indicación médica.

Es conveniente ingerir los comprimidos junto a las comidas.

Contraindicaciones

Vertin[®] (lomofilina-dihidroergocristina) está contraindicado en caso de hipersensibilidad conocida a alguno de sus componentes.

El mesilato de dihidroergocristina se halla contraindicado en pacientes portadores de psicosis aguda o crónica.

Precauciones y Advertencias

Previo al inicio del tratamiento con **Vertin**[®] (lomofilina-dihidroergocristina) descartar causas reversibles de deterioro psico-comportamental o que tengan tratamiento específico. El uso en pacientes portadores de hipotensión arterial, daño hepático o renal severos debe realizarse con precaución y estricto control médico.

Embarazo y lactancia

Aunque los estudios relativos a teratogenicidad arrojan resultados negativos, **Vertin**[®] (lomofilina-dihidroergocristina) no está indicado durante el embarazo y la lactancia.

Uso pediátrico

No está indicado el uso de **Vertin**[®] (lomofilina-dihidroergocristina) en niños.

Reacciones colaterales

Vertin[®] (lomofilina-dihidroergocristina) es en general bien tolerado. Durante su empleo puede aparecer hipotensión ortostática vinculada a su acción vasodilatadora. Este evento es transitorio y desaparece con la continuación del tratamiento.

Con menor frecuencia pueden ocurrir molestias digestivas, sequedad bucal, bradicardia, tuforadas, obstrucción nasal, agitación, nerviosismo, insomnio, y visión borrosa.

Interacciones

Puede inferirse a partir del mecanismo de acción de los 2 componentes de **Vertin**[®] (lomofilina-dihidroergocristina) que podría ocurrir aumento del efecto de antihipertensivos y anticoagulantes si se produce la administración simultánea.

Presentaciones

Vertin[®]- estuches conteniendo 20, 40 y 60 comprimidos recubiertos gastroresistentes de lomofilina 80 mg + dihidroergocristina mesilato 0,8 mg.

Condiciones de conservación

Conservar a temperatura ambiente (15°C - 30°C).

NO UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO INDICADA EN EL ENVASE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (C.I.A.T.) Tel.: 1722

Elaborado por:



EUROFARMA URUGUAY S.A.

Democracia 2132

Tel.: 2401 5454 - Fax: 2402 0808

Montevideo - Uruguay

www.eurofarma.com.uy

2161270513